

Изход от лечението на пациенти с чувствителна туберкулоза

Излекуван	Случай с микробиологично диагностицирана белодробна туберкулоза в началото на лечението, който е с отрицателно микроскопско или културелно изследване през последния месец на лечението.
Завършено лечение¹	Случай с ТБ, който е завършил лечението без критерии за неуспех, но няма данни, удостоверяващи, че резултатите от микроскопските или културелните изследвания през последния месец на лечението и поне веднъж преди това са били отрицателни – не са били проведени или резултатите от тях не са налични
Неуспех от лечението	Случай с ТБ, при който резултатите от микроскопските или културелните изследвания са положителни на петия месец или на по-късен стадий от лечението. ²
Починал	Случай с ТБ, починал след поставяне на диагнозата, преди започване на лечението или по време на лечението, независимо от причината за смъртта
Отпаднал от проследяване	Случай с ТБ, който не е започнал лечение или чието лечение е било прекъснато в продължение на 2 или повече последователни месеци
Недокументиран изход от лечението	Случай с ТБ с неизвестен изход от лечението. Тук се включват случаи „прехвърлени към” друго лечебно заведение за лечение на туберкулоза, както и случаи, за които изходът от лечението е неизвестен

¹ Сумата от броя на излекуваните и завършилите лечението пациенти се определя като „успех от лечението”.

² Към тази категория се включва и пациент, който преди началото на лечението е бил с отрицателна микроскопия и е станал положителен след завършването на интензивната фаза на лечение или има реверсия в продължителната фаза.

Изход от лечението на пациенти с резистентна туберкулоза

Излекуван	Случай на резистентна туберкулоза, при който лечението е приключило без доказателство за неуспех и има три или повече последователни култури, взети в интервал от поне 30 дни.
Завършено лечение	Случай с резистентна туберкулоза, който е завършил лечението без доказателство за неуспех, но няма регистрирани три или повече последователни култури, взети в интервал от поне 30 дни
Неуспех от лечението	Случай с прекъсване на лечението или необходимост от промяна на терапевтичния режим за поне два противотуберкулозни лекарствени продукти поради: – липса на конверсия в края на интензивната фазаа, <i>или</i> – микробиологична реверсия в продължителната фаза след конверсия, или – наличие на допълнително придобита резистентност към флуорохинолони или към инжекционни лекарствени продукти от втори ред, или – нежелани лекарствени реакции.
Починал	Случай на резистентна туберкулоза, починал след поставяне на диагнозата и преди започване на лечението или по време на лечението, независимо от причината за смъртта
Отпаднал от проследяване	Случай с резистентна туберкулоза, който не е започнал лечение или чието лечение е било прекъснато в продължение на 2 или повече последователни месеци
Недокументиран изход от лечението	Случай с резистентна туберкулоза с неизвестен изход от лечението. Тук се включват случаи на „прехвърлен към” друго лечебно заведение за лечение, както и случаи, за които изходът от лечението е неизвестен