



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

пл. „Св. Неделя“ № 5, София 1000  
тел.: (+359 2) 9301 268  
факс: (+359 2) 981 1833

[www.mh.gov.bgs](http://www.mh.gov.bgs)

**БАЛНЕОЛОГИЧНА ОЦЕНКА**

**№ 127**  
**от .....13.06..... 2019 г.**

Тази балнеологична оценка удостоверява, че минералната вода, добита от водовземно съоръжение

*съоръжение № 1  
находище на минерална вода „Неделино“, гр. Неделино, община Неделино, област Смолян* има следните:

**A. Геоложки и хидрологически характеристики:**

**Местоположение**

Водовземните съоръжения на находище на минерална вода „Неделино“ са разположени в регулатационните граници на гр. Неделино, област Смолян. Сондаж № 1 е изграден в УПИ I-762 по ПУП на гр. Неделино.

**Формираща среда на минералната вода**

Находище на минерални води „Неделино“ е формирано в метаморфно пространство в Източно Родопския блок. То има сложен строеж. Подземните води са акумулирани в мраморни пластове, които са част от строежа на Чепеларската пъстра свита (задругата на амфиболити и мрамори). Мраморите са вместили сред амфиболитите и имат разкритие на повърхността западно от гр. Неделино. Като по-крайни от вместващите ги метаморфни скали, мраморите са силно напукани, на места са тектонски разломи и натрошени, на места окарстени и се явяват по-добър колектор на пукнатинни води в разглежданата геологичка среда. В разглежданото мраморно тяло, явяващо се във вид на ивица, потъваща в източна посока, се реализира подхранване, дълбочинна мобилизация и пренос на субтермални води и геотермална енергия и общо разпределение на хидротермалния поток във вътрешни и периферни разломно-дренажни зони.

Основна роля в развитието и функционирането на термоводоносната система на минералното находище играят разломно-разседните дислокации, съвременните тектонски движения и напрежения и свързаните с тях зони на повишена и висока проницаемост.

По описаните структурни и обемно-пространствени признания находище на минерални води „Неделино“ се отнася към 5-та група – Разломно-пукнатинни термоводоносни системи в гранито-метаморфни тела и системи.

Групиране по други важни хидрологични признания и характеристики:

По условия на хидротермална циркуляция и акумулация находище на минерална вода „Неделино“ се отнася към нестратифицирани системи с разломно-пукнатинна и пукнатино-жилна циркуляция и акумулация.

По условия на водообмен: минералните води са акумулирани в отворени за инфильтрационно подхранване мраморни пластове с повърхностно разкритие и възможност за гравитационен водообмен. В колектора се осъществява постоянно възстановяване и репродукция на водните ресурси, което е основание находище на минерална вода „Неделино“ да се разглежда като хидрогеотермална структура с динамичен, репродуктивен и инфильтрационен водообмен.

По условия на топлопренасяне: като динамична и репродуктивна термоводоносна система, находище на минерална вода „Неделино“ се характеризира с конвективно или филтрационно топлопренасяне, при което възходящи или латерални потоци пренасят топлинна енергия по разломни дислокации и други секущи проницаеми тела от по-дълбоки към по-плитки секущи тела.

### **Подхранване на находището**

Минералната вода е с атмосферно-инфилтрационен произход и дълбока циркулация. Подхранването е за сметка на атмосферните валежи.

### **Колектор на минералната вода**

Колектор на минералните води са мраморите, явяващи се във вид на пласт сред амфиболитите от Задругата на амфиболитите и мраморите, съответстваща на Чепеларската пъстра свита (t<sub>c</sub>PeD).

Мраморите са бели до розови и охрени, средно- до едрозърнести. Сред тях се срещат прослойки от нечисти мрамори до калкошисти и по-рядко от гнайси и ивичести амфиболити. Мраморите са почти повсеместно мрежовидно напукани с преотложен карбонат по пукнатините, окарстени и розови до охрени от железни хидроксиди. Всички скални разновидности и най-вече техните контакти са послойно и секущо тектонизирани, на места – напукани до натрошени или брекчирани, доведени до тектонска глина или окварцени с впръслеци от дребни пиритни минерали.

Мраморите, в които са акумулирани минералните води са преминати в интервала 213,90 – 341,00 м. На повърхността мраморите се разкриват във вид на ивица, разположена западно от гр. Неделино. Тя се явява тяхна зона на подхранване с инфильтриращи валежни води.

### **Експлоатационни водоизточници на минерална вода в находището**

Находище на минерална вода „Неделино“ е разкрито чрез две водовземни съоръжения: сондаж № 1 и сондаж № 2.

Сондаж 1 е прокаран през 2016 г. Сондирането е извършено ядково, със сондажна апаратура „MDT 80V“.

Преминатият геологически разрез от сондаж № 1 е следният:

- от 0,00 до 5,80 м – алувиален, чакълесто-песъчлив слой с късове основно от метаморфни скали – разнообразни гнайси, амфиболити, метаморфен и руден кварц, мрамори и др; Кватернер – алувиал (aQh);

- от 5,80 до 149,10 м – гнайси, биотитови, ивичести мигматизирани, бедни на слюда с лещи от ивичести амфиболити и ултрабазити с различна дебелина. Скалите са изветрели силно до 12,00 м. Всички скални разновидности са послойно и косо напукани, на доста места натрошени, милонитизирани или брекчирани, хлоритизирани, с карбонатни налепи по отворени пукнатини и рудни минерали. Протерозой Задруга на мигматизираните биотитови гнайси (P1), съответстваща на Богутевска плагиогнайсова свита (bogPeD);

- от 149,10 до 213,90 м – амфиболити, ивичести, редувавщи се с по-дебели прослойки от биотитови гнайси, мигматизирани, преобладаващо ивичести и по-рядко очни, както и с амфибол-биотитови гнайси, с по-тънки прослойки от мрамори, бели до нечисти и единични

лещи от ултрабазити, на места с тектонски зони с натрошаване, брекчиране и милонитизация; Задруга на амфиболитите и мраморите (P1), съответстваща на Чепеларска пъстра свита (t<sub>c</sub>P<sub>e</sub>D);

- от 213,90 до 341,00 м – мрамори, бели, розови до охрени, средно- до едрозърнести с прослойки от нечисти мрамори до калкошисти и ивичести амфиболити. Всички скални разновидности и най-вече техните контакти са послойно и секущо тектонизирани, на места – напукани до натрошени или брекчириани, доведени до тектонска глина или окварцени с впръслеци от дребни пиритни минерали. Задруга на амфиболитите и мраморите (P1), съответстваща на Чепеларска пъстра свита (t<sub>c</sub>P<sub>e</sub>D);

- от 341,00 до 358,00 м – мрамори, бели, розови до охрени, средно- до едрозърнести с прослойки от нечисти мрамори до калкошисти и ивичести амфиболити, на места послойно и секущо тектонизирани; Задруга на амфиболитите и мраморите (P1), съответстваща на Чепеларска пъстра свита (t<sub>c</sub>P<sub>e</sub>D);

- от 358,00 до 600,00 м – амфиболити, ивичести, редувачи се с дебели прослойки от биотитови гнейси, мигматизирани, ивичести и очни, с амфибол-биотитови гнейси, с по-тънки прослойки от мрамори, бели до нечисти, дребнозърнести до порцелановидни и единични лещи от ултрабазити, на места напукани до натрошени, рядко с вид на брекчириани. Задруга на амфиболитите и мраморите (P1), съответстваща на Чепеларска пъстра свита (t<sub>c</sub>P<sub>e</sub>D).

Конструкцията на сондаж 1 е следната:

- от 0,00 до 15,00 м – метална кондукторна колона с Ø 108 mm, плътна и задгръбно циментирана;
- от 15,00 до 347,00 м – открит ствол на сондажа с диаметри на отвора Ø 96 mm;
- от 347,00 до 600,00 м - открит ствол Ø 76 mm.

### Експлоатационни ресурси

Със Заповед № РД-6 от 04.01.2018 г. на министърът на околната среда и водите са утвърдени експлоатационни ресурси на находище на минерална вода „Неделино“, както следва:

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура	Експлоатационни ресурси хидрогеотермални отвори		
	Q <sub>1,1</sub> (л/сек)	Q <sub>1,2</sub> (л/сек)	Q <sub>2,1</sub> (л/сек)		Q (л/сек)	T <sub>1</sub> (°C)	T <sub>2</sub> (°C)
находище на минерална вода „Неделино“, община Неделино, област Смолян – пукнатинно-карстова водоносна система формирана в амфиболитите и мраморите на Чепеларската пъстра свита (t <sub>c</sub> P <sub>e</sub> D)	2,70	3,60	2,70	28,1-31,8	4,27 сондаж №1 2,03 сондаж №2	13,1 16,8	234,37 сондаж №1 142,90 сондаж №2
6,30							

и технически възможен дебит на водовземното съоръжение:

Водовземни съоръжения:	Технически възможен дебит на водовземните съоръжения	Кота ПВН	Допустимо понижение S <sub> доп</sub>	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура	T (°C)
Сондаж № 1	4,27	543,89	53,17	-	Самоизлив до кота 490,72	28,1	

### Каптиране

Сондаж № 1 е ново водовземно съоръжение, изградено със съвременна сондажна апаратура. Техническото и общо състояние на водовземното съоръжение е много добро. Предстои изграждането на каптаж за неговата защита.

### Санитарно-охранителна зона

Определянето на санитарно-охранителната зона на находище на минерална вода „Неделино“ е в процедура по реда на Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88 от 2000 г.).

### Б. Състав:

<b>1. Аниони</b>	<b>mg/l</b>	<b>eq%</b>
F <sup>-</sup>	0,14	0,184
Cl <sup>-</sup>	7,27	5,108
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	24,07	12,482
CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	< 6,00	0,000
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	201,36	82,226
HSiO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	-	-
NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	< 0,05	0,000
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	< 1,00	0,000
<b>Сума:</b>	<b>232,84</b>	<b>~100,00</b>

Сух остатък при 180°C 212 mg/l  
 Сух остатък при 260°C 189 mg/l  
 Електропроводимост при 25°C 349 μS/cm  
 pH 7,6

<b>2. Катиони</b>	<b>mg/l</b>	<b>eq%</b>
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	< 0,05	0,000
Ca <sup>2+</sup>	46,09	57,852
Mg <sup>2+</sup>	13,62	28,197
Na <sup>+</sup>	11,95	13,075
K <sup>+</sup>	1,34	0,862
Fe-общо	0,03	0,014
Li <sup>+</sup>	< 0,05	0,000
Mn <sup>2+</sup>	< 0,02	0,000
<b>Сума:</b>	<b>73,03</b>	<b>~100,00</b>

H<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> 19,34 mg/l  
 Обща минерализация 325 mg/l  
 Въглероден диоксид 10,56 mg/l  
 Оксисляеми от йод серни съединения 0,51 mg/l  
 Дебит 4,27 l/s  
 Температура 22,4 °C

Външен вид: Водата е бистра, безцветна, без вкус и мирис.

<b>3. Микроелементи</b>	<b>(mg/l)</b>
Алуминий	0,070
Арсен	< 0,010
Антимон	< 0,005
Кадмий	< 0,003
Хром	< 0,005
Мед	< 0,050
Никел	< 0,005
Олово	< 0,010

Селен	< 0,010
Живак	< 0,001
Цинк	0,030
Барий	0,012
Бор	0,186
Цианиди	< 0,010
Сребро	< 0,050

Данните са съгласно Протоколи от изпитване № 121 от 30.08.2018 г. на Специализирана лаборатория за анализ на минерални води към „НСБФТР“ ЕАД, гр. София, Протокол от 11.06.2018 г. на РЗИ Смолян.

### 4. Радиологични показатели

Обща α- активност	0,061±0,013 Bq/l	Естествен уран	< 0,0020 mg/l
Обща β- активност	0,060±0,010 Bq/l	Обща индикативна доза	< 0,10 mSv/year
Радий-226	0,128±0,035 Bq/l		

Данните са съгласно Протоколи за контрол на радиологични показатели на вода № W 140a и № W 140b от 31.08.2018 г. на Орган за контрол от вида A при НЦРРЗ.

### **5. Микробиологични показатели**

Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми при $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ за 72 ч.	0 КОЕ/ $\text{см}^3$	Ешерихия коли при $43^{\circ}\text{C}$	0/250 $\text{см}^3$
Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми при $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ за 24 ч.	0 КОЕ/ $\text{см}^3$	Фекални стрептококки (ентерококки)	0/250 $\text{см}^3$
Колиформи при $37^{\circ}\text{C}$	0/250 $\text{см}^3$	Сулфитредуциращи клостриидии	0/50 $\text{см}^3$
		Псевдомонас аерогиноза	0/250 $\text{см}^3$

Данните са съгласно Протокол от изпитване № 628-МБ от 15.06.2018 г. на Лаборатория за изпитване при РЗИ Смолян.

### **Заключение:**

Общата минерализация на минералната вода от сондаж № 1, находище на минерална вода „Неделино”, гр. Неделино, община Неделино, област Смолян е 325 mg/l. Характеризира се като хипотермална, слабо минерализирана, хидрокарбонатно калциево-магнезиева вода, без санитарно-химични и микробиологични признания на замърсяване. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти и стойностите на радиологичните показатели са в границите на нормите за минерални води. Водата има стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, бр. 79 от 1987 г., посл. изм. бр. 70 от 2004 г.).

### **B. Свойства:**

**Лечебно-профилактичните свойства на водата** се определят от слабата минерализация, наличието на хидрокарбонатни, калциеви и магнезиеви йони. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху stomашно-чревния тракт, жълчно-чернодробната и бъбреенно-отделителната системи. Водата намалява лекостепенно хиперацидитета на stomашния сок и стимулира кинетиката на жълчните пътища. Наличието на калций във водата повлиява обмяната на веществата, по-специално пуриновата обмяна, като съдейства за пълното изгаряне и изхвърляне на пурините от организма. Наличието на магнезий във водата има съдоразширяващо и успокоятелно действие върху организма, възпрепятства образуването на фосфатни конкременти в бъбреците и намалява нивото на холестерола. Подобрява мускулната функция. Ниската минерализация потенцира диурезата.

**При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика** (след темпериране до 35-37°C) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: stomашно-чревни заболявания (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жълчно-чернодробни заболявания (жълчно-каменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жълчните пътища и др.); бъбреенно-урологични заболявания (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболитни заболявания (подагра, затъпяване, захарен диабет и др.).

**Използването на минералната вода за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (количества на приемата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).**

**При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика** (след темпериране до 35-37°C) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания (артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилоартрит и др.); заболявания на периферната нервна система (дископатии,

радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния); кожни заболявания от възпалително и алергично естество (екземи, дерматити, псориазис).

*Противопоказания за външно балнеолечение: специфични заболявания; онкологични заболявания; инфекциозни заболявания; заболявания в активен стадий и декомпенсирана функция на органи и системи; ХИБС - ритъмни нарушения; епилепсия.*

Минералната вода може да бъде използвана за хигиенни и спортно-рекреативни цели след съответно темпериране.

*В случаите, когато минералната вода от водовземно съоръжение – сондаж № 1, находище на минерална вода „Неделино”, гр. Неделино, община Неделино, област Смолян се ползва за цели различни от посочените в балнеологичната оценка или когато водата се ползва по начин, който променя минералния състав посочен в балнеологичната оценка, следва да бъде получено одобрение от Министерство на здравеопазването за всяка конкретна цел и начин на нейното приложение.*

МИНИСТЪР:  
КИРИЛ АНАНИЕВ

